






Infektiekansen voor LELIE

		Zat 23 jun	Zon 24 jun	Maa 25 jun	Din 26 jun	Woe 27 jun	Don 28 jun	Vry 29 jun
Infektiekans LELIE	%	0	0	3	2	11	13	12

Weersverwachting

		Din 26 jun	Woe 27 jun	Don 28 jun	Vry 29 jun	Zat 30 jun
						
Temp. 1.5 m. min-max	°C	13 - 17	13 - 19	16 - 21	15 - 18	15 - 20
Nachtvorstkans						
Temp. 0.10 m. min-max	°C	11 - 19	12 - 21	14 - 23	13 - 19	13 - 22
Bladnat	/3uur	●●●●○○○○	●●●●○○○○	●●●●○○○○	○●●●○○○○	○●●●○○○○
Neerslag	mm	0	0	0	0	0
Neerslagkans	%	10	0	0	0	10
Windrichting		N - WZW	NNO - NO	N - NO	N - WZW	N - NO
Wind spuitboomhoogte	m/s	2 - 4	2 - 4	2 - 4	2 - 5	2 - 4
Referentieverdamping	mm	3.8	4.3	5.1	4.9	5

Advies vuurbestrijding LELIE

Dagen sinds laatste besp. →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Erg gevoelige cultivars	-	-	-	-	-	-	-	S	S	S	S	S	S
Matig gevoelige cultivars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Niet gevoelige cultivars	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- Bespuiting uitstellen c.q. beperken tot basismiddel S = spuitadvies (groep 2-2A-2B) S+ = spuitadvies (groep 2B)

Groep 1: Mancozeb (basismiddel)

Groep 2A: Flint, Frupica, Kenbyo, Luna, Rovral Groep 2B: Folicur, Rudis, Spirit

Effect bespuiting (Gewis)

	Din 26 ochtend	middag	avond	Woe 27 zon op	ochtend	middag	avond	Don 28 zon op
Vuur - oa Mancozeb	++	++	++	+	++	++	++	++
Vuur - oa Kenbyo/Folicur/Flint	+	+	+	+	+	+	+	+
Onkruid - bodem oa Goltix/Pyramin/Stomp	-	-	-	-	-	-	-	-
Onkruid - bodem en contact oa Goltix	+	+	+	+	+	+	0	+
Onkruid - grassen Focus Plus	++	+	+	+	++	+	+	+
Kans op gewasschade onkruidmiddelen	+	+	++	++	++	++	++	++
Luis - Pirimor	0	+	-	-	-	-	+	+
Luis - Calypso/Teppeki/Movento	+	++	++	+	0	+	++	+
Virus - Karate Zeon/Sumicidin/Decis	++	++	++	++	0	0	++	++
Vloeibare bladmeststoffen	-	-	-	-	0	-	-	-
Windsnelheid spuitboomhoogte (m/s)	3	4	4	2	2	3	4	2
Neerslagkans (%)	0	0	0	0	0	0	0	0

Kans op gewasschade: ++ geen 0 gering -- groot